



ANEXO 3

GLOSARIO

Abeja: Insecto de color pardo negruzco con franjas amarillas, vellos rojizos en todo el cuerpo y cuatro alas membranosas, mide aproximadamente catorce milímetros de largo. Sufre una metamorfosis completa y es muy importante económicamente para la polinización de algunos productos agrícolas y la producción de miel y cera.

Abeja cerera:

Abeja encargada de producir la cera para fabricar los panales.

Año calendario:

Es el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

Año ganadero:

Es el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto del año siguiente.

Ave: Se refiere pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.

Ave en ciclo de engorda:

Pollos que se engordan para finalizarlos y sacrificarlos.

Ave ligera:

Aves cuyas características genéticas se especializan en la línea de producción de huevo para plato, generalmente blanco.

Ave pesada:

Aves cuyas características genéticas se especializan en la línea de producción de carne.

**Ave ligera y/o semipesada:**

Aves cuyas características genéticas se especializan en la línea de producción, donde su fin productivo es de doble propósito: producción de carne y huevo generalmente marrón o rojo.

Becerro: Macho y hembra de la especie bovina en periodo de lactancia.

Bovino de carne o engorda:

Animales de la especie bovina cuya raza está especializada en la producción de carne.

Bovino leche:

Animales de la especie bovina, cuya raza está especializada en la producción de leche.

Bovino de doble propósito:

Animales de la especie bovina de razas o híbridos cuya habilidad productiva permite obtener adecuados niveles de producción de leche y buen rendimiento del ganado en canal.

Buey: Macho bovino castrado, que se utiliza como animal de tiro para trabajos agrícolas o para conducir reses bravas o cerriles, mancornadas a él.

Carne en canal de bovino, ovino y caprino:

Parte del cuerpo de los animales sacrificados, después de retirárseles la piel, cabeza, las vísceras con sus contenidos, la sangre y la parte distal de los miembros.

Carne en canal de porcino:

Se entiende por carne en canal al cuerpo del animal sacrificado, desangrado, sin pelo, eviscerado (pudiendo permanecer los riñones y la grasa interna), con cuero y con la cabeza adherida por los tejidos blandos al resto



del cuerpo.

Carne en canal de ave:

Es el pollo, gallina o guajolote sacrificado, desangrado y desplumado al cual se le ha quitado la cabeza, pescuezo, buche, patas, glándula aceitosa de la cola, vísceras abdominales.

Cera: Sustancia sólida de aspecto graso y color amarillo, que secretan las abejas para hacer las celdillas de los panales.

Cerdo en crecimiento:

Etapa comprendida desde el destete hasta antes de la finalización.

Cerdo finalizado:

Cerdo que ha llegado a su última etapa de crecimiento, con un peso de 90 a 110 kilogramos y que está listo para ser enviado al mercado.

Conejo: Animal mamífero roedor, de cuerpo alargado, cubierto de pelo espeso y sedoso, mide en general unos 40 centímetros de largo.

Crías: Animales recién nacidos hasta un año de edad.

Días promedio en producción (vaca/año):

Es el número de días en que una vaca se encuentra en producción (en ordeña).

Especie ganadera:

Es la unidad básica de clasificación que permite ubicar en la categoría que le corresponde a los animales con características y rasgos comunes entre sí.

Estabulación:

Se refiere al sistema en el que la cría y mantenimiento



del ganado se lleva a cabo en establos o lugares similares, obteniéndose mayores rendimientos por la tecnología empleada en sus cuidados y aprovechamiento.

Gallina:- Denominación de hembras del género *Gallus* para las dos funciones zootécnicas; postura en razas ligeras y semipesadas, y de engorda en pesadas.

Gallina en producción:

Hembra en explotación económica, que se encuentra en fase de postura.

Ganadería estacional:

Sistemas productivos extensivos que muestran fluctuaciones en sus niveles de producción a lo largo del año, debido a la disponibilidad de recursos alimenticios naturales; en las zonas áridas la actividad ganadera está condicionada a la presencia de forraje después de las lluvias y al abastecimiento de agua durante el pastoreo; en la zona tropical está condicionada a la época de mayor disponibilidad de forraje y en algunas zonas, al acceso del ganado en áreas inundables.

Ganado bovino:

Especie animal cuya finalidad zootécnica, de acuerdo a su raza o hibridación, es la producción de leche, carne o ambas, incluye becerro, buey, torete, toro, vaca y vaquilla.

Ganado caprino:

Especie animal cuya finalidad zootécnica, de acuerdo a su raza o hibridación es fundamentalmente la producción de carne y/o leche, se les conoce como cabra o chiva.

Ganado en pie:

La producción de ganado en pie, es el peso que tiene un animal vivo con destino al sacrificio o a la exportación.

**Ganado enviado al sacrificio:**

Se refiere a los animales sacrificados por alguna razón económica, de salud u organizacional.

Ganado finalizado enviado al sacrificio:

Es el ganado que una vez terminado su período de engorda reúne las condiciones necesarias de edad y peso para ser sacrificado y procesado.

Ganado ovino:

Especie animal cuya finalidad zootécnica, de acuerdo a su raza o hibridación es fundamentalmente la producción de carne y/o lana, se refiere a borrega, borrego, carnero y cordero.

Ganado porcino:

Especie animal cuya finalidad zootécnica es principalmente la producción de carne. Se le denomina como cerdo, cochino, marrano y puerco.

Guajolote:

Ave doméstica originaria de México que pertenece al orden de las gallináceas. Su finalidad zootécnica es la producción de carne.

Hato: Conjunto de bovinos que se encuentran ubicados en una unidad de producción particular o bien, determinado como hato municipal, estatal y nacional. Conjunto de animales de la misma especie que andan reunidos.

Huevo: Cuerpo ovoide formado en el aparato reproductor de las aves hembras y otras especies animales, que es el medio de reproducción de los animales vertebrados ovíparos.

Huevo fértil:

Huevo fecundado, destinado a la incubación para la



producción de aves (progenitora, reproductora, pollo de engorda o gallina de postura).

Huevo para plato:

Huevo no fértil o fecundado, destinado al consumo humano o a la industrialización.

Lana:

Recubrimiento piloso de los ovinos, formado por queratina y grasas (suarda), destinada a su aprovechamiento por la industria textil. La unidad elemental de la lana es la fibra, la cual puede ser ondulada, crispada, lisa o espiral.

Leche: Líquido secretado por las glándulas mamarias de las hembras de los bovinos y caprinos destinada a la alimentación de las crías y que es aprovechada por el hombre para su consumo o industrialización.

Lechón: Crías de los cerdos desde el nacimiento hasta el destete, que no han alcanzado las ocho semanas de nacidos, cumplido este periodo son retiradas de las madres.

Miel: Sustancia viscosa, amarillenta y dulce que producen las abejas al transformar en su organismo el néctar y algunos jugos de algunos vegetales y que es depositada en los alvéolos o celdillas de los panales.

Mortalidad:

Evento que indica la pérdida de la vida de los animales en un periodo determinado, independientemente de la voluntad humana. La mortalidad varía de acuerdo a la edad, género y especie animal.

Novillo:

Es el bovino macho joven de 12 hasta 42 meses de edad, castrado en los primeros meses de su vida, antes de desarrollar los caracteres sexuales secundarios.



Número de lechones por parto:

Es el promedio de lechones que pare cada vientre, y se obtiene dividiendo el total de crías nacidas entre el total de vientres paridos.

Número de lechones destetados:

Lechones que inician el proceso de desarrollo y engorda, después del destete.

Número de ciclos al año:

Número de veces al año en que se finalizan las aves.

Número promedio de pollos en ciclos de engorda:

Es aquella población que se encuentre en engorda en un lapso determinado.

Partos promedio por vientre:

Es la enumeración de veces que una especie animal tuvo crías durante un periodo determinado.

Piara: Conjunto de cerdos.

Pie de cría:

Se considerará a las hembras y machos cuya finalidad principal es el incremento de la población de la especie pecuaria.

Población pecuaria:

Conjunto de animales domésticos de una o varias especies.

Porcentaje de mortalidad:

Es el resultado de dividir el número de animales muertos durante un año entre los existentes en los diferentes estratos del hato.

Porcino corriente:

Animal cuyo origen no tiene mejoramiento genético, ni



un manejo de producción tecnificado o semitecnificado.

Porcino criollo:

Animal que no ha tenido un manejo de mejoramiento genético por el hombre, únicamente selección natural.

Porcino supremo:

Animal cuyo origen tiene un mejoramiento genético, así como un manejo tecnificado o semitecnificado.

Producción de leche, lt/cabeza/año:

Es el volumen de la producción anual entre los vientres en producción.

Producción pecuaria:

Es la cantidad de producto que se obtiene de una especie animal, en un periodo determinado, ya sea que ésta lo produzca o bien que la especie misma sea el producto, cuantificado en litros o toneladas.

Producto ganadero:

Es el bien específico que resultó del proceso productivo en cada una de las especies en el año.

Progenitora:

Ave de elevado valor genético, cuya función es producir aves reproductoras. Estas aves son hijas de las aves línea pura y se les conoce también como abuelas.

Rastro: Lugar donde se sacrifica y desuella el ganado y ave, para su posterior venta, generalmente al mayoreo.

Reemplazo:

Hembras o machos seleccionados de la propia producción o adquiridos en otra explotación, para sustituir al pie de cría que se desecha o muere.

**Reproductora:**

Ave de importante valor genético cuya función es producir la gallina de postura comercial o el pollo de engorda. Estas aves son hijas de las progenitoras y se les denomina aves madre.

Sacrificio:

Es la acción de suprimir la vida de una especie animal a efecto de aprovecharla como producción de carne.

Semental:

Se considera a los machos adultos con capacidad reproductiva destinado a montar, cargar, obtención de semen o fecundar.

Semitecnificado:

Ganado en explotaciones con grado medio de desarrollo y en donde se practican algunas actividades de manejo.

Tasa de extracción:

Es el resultado de dividir el número de animales extraídos para cualquier propósito (sacrificio, repasto, exportación, etc.), entre el total del inventario.

Tecnificado:

Introducir tecnología actualizada en el proceso productivo de la explotación ganadera o pecuaria, para incrementar la producción y mejorar la calidad.

Torete: Cría macho bovino que tiene entre uno y tres años de edad, cuya finalidad será la reproducción, pero sin haber iniciado su labor de fecundar.

Toro: Bovino macho de más de tres años de edad, sin importar su actividad zootécnica (incluye bueyes).

**Unidad Animal:**

Unidad de medida utilizada para cuantificar el volumen de alimento necesario para mantener una vaca adulta de 400 a 500 kilogramos de peso, en gestación o mantenimiento.

Valor de la producción:

Es la cuantificación monetaria del volumen de producción a los precios pagados a los productores.

Vaquilla: Cría bovino mayor de un año y que no ha parido, puede estar cargada o en capacidad de ser fecundada.

Vientres: Hembra fértil que se utiliza como reproductora desde su primer parto en adelante.

Vientres de desecho:

Son las vacas o cerdas que se envían al sacrificio por haber perdido su capacidad productiva.

Vientres en producción:

Se considerará a las hembras adultas desde su primer parto en adelante y que se encuentran en plena producción y ordeña.

Vientres paridos:

Son aquellas hembras que tuvieron una parición dentro de un periodo determinado.

Vientres secos:

Se consideran a los vientres los cuales están fuera de producción y ordeña.

Zootecnia:

es la ciencia pecuaria encargada de la producción de proteína animal (carne, leche, huevo, etc.) para consumo humano y animal, y asegurar la seguridad alimentaria del país.



Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Este tiraje consta de 500 ejemplares.

Impresión realizada en los Talleres Gráficos del

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
Avenida Benjamín Franklin 146
Colonia Escandón
Delegación Miguel Hidalgo
México, DF

Septiembre de 2007

